

3000000	Social	301	Salud publica		3	2.1	Mantener en 0 la tasa de mortalidad materna	Razón de mortalidad materna x 100.000 N.V.	0	0	3.1	Acciones de Promoción de la salud y calidad de vida	Estrategia de inducción a los servicios de control prenatal en ambientes cotidianos, laborales, educativos, publicos y comunitarios.	Estrategia de inducción a los servicios de control prenatal en ambientes cotidianos implementado.	1	1	1	1									
3000000	Social	301	Salud publica		3	2.2	Aportar a disminuir la tasa de mortalidad de cancer de cervix y Seno del Dpto	Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino y Seno x cien mil mujeres (Dato Dpto)	7.3	6.5	3.1	Acciones de Promoción de la salud y calidad de vida	Estrategias de inducción a los servicios de tamizaje, detección temprana y tratamiento para el cáncer de cuello uterino en ambitos cotidianos.	ESE Ucata que desarrollan la estrategia de inducción a los servicios de tamizaje, detección temprana y tratamiento para el cáncer de cuello uterino en ámbitos cotidianos.	80%	0%	20%	40%	80%								
3000000	Social	301	Salud publica		3	2.3	Aportar a mantener la prevalencia de infección VIH del Dpto	Tasa de incidencia de VIH de transmisión perinatal (vertical) (Dato Dpto)	0.5	0.5	3.1	Acciones de Promoción de la salud y calidad de vida	Implementar estrategias de IEC por medios masivos y formulación de políticas para la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria para la detección de VIH SIDA en población general y gestantes.	Cumplimiento de las acciones de IEC y formulación de políticas públicas para la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria para vih en población general y gestantes.	100%	20%	40%	80%	100%	4.310.124,98	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.499,99	1.157.624,99			
											3.2	Acciones de Prevención de los riesgos, recuperación y superación de los daños	Apoyo a la auditoria de la oferta de pruebas de VIH y suministro de tratamiento a mujeres embarazadas y leche de fórmula a los recién nacidos para reducir la transmisión perinatal del VIH a cargo de las EPS y DTS en población no afiliada.	Cumplimiento en la auditoria de oferta de pruebas de VIH y suministro de tratamiento a mujeres embarazadas y fórmula láctea de reemplazo.	100%	50%	100%	100%									
													Desarrollo del modelo de gestión programática del VIH y la guía para el manejo sin barreras y con calidad de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.	ESE Ucata con el plan de respuesta y el modelo de gestión programática del VIH y guía de atención integral implementada	100%	50%	100%	100%									
3000000	Social	301	Salud publica		3	3	Aportar a disminuir el índice de Cariados, Obturados y Perdidos (COP) promedio en la población a los	Meta de cumplimiento de aplicación de sellantes en población de 3 a 15 años.	Nacional: Índice COP a los 12 años de edad de 2,3. Fuente: III ENSB 1999	< 2,3	3.1	Acciones de promoción de la salud y calidad de vida.	Estrategia de inducción a los servicios de salud oral en la población en general incluidos en el POS.	Estrategia de inducción a los servicios de salud oral implementada por ESE	1	1	1	1									
3000000	Social	301	Salud publica		3	4	Adaptar y adoptar la política de Salud Mental, de Reducción de consumo de sustancias Psicoactivas, y de construcción de paz y convivencia familiar Haz Paz	Planes de Salud Mental, de Reducción de consumo de sustancias Psicoactivas, y de construcción de paz y convivencia familiar Haz Paz Implementados	0	1	3.1	Acciones de Promoción de la salud y calidad de vida	Elaboración del plan de acción Municipal de Haz Paz para la prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de genero	Implementación del plan de acción	1	1	1	1		8.620.290,00	2.000.000,00	2.100.000	2.205.000	2.315.250			
													Adopción y fortalecimiento de la política del campo de la salud mental-APS.	política de Salud Mental implementada	1	0	1	1									
													Fortalecer la red de apoyo con la inclusión de representantes de asociaciones de usuarios para el desarrollo de Actividades de Promoción de la Política de Salud Mental. Prevención de tranzornos mentales, prevención de la Violencia intrafamiliar Sexual	Red fortalecida y operando con representantes de Asociación de usuarios	1	1	1	1		862.025	200.000	210.000	220.500	231.525			
													Implementación de la estrategia habilidades para la vida para la promoción de la Salud Mental y la Prevención del Consumo de SPA	Estrategia en habilidades para la vida operando.	1	0	1	1									

3000000	Social	301	Salud publica		3	5	Aumentar a un 70% el porcentaje de captación de sintomáticos respiratorios	Porcentaje de captación de sintomáticos respiratorios en coordinación con las ESE Ucata	13%	70%	3.1	Acciones de Promoción de la salud y calidad de vida	Apoyo al Departamento para la implementación de la estrategia de tamizaje en Salud Mental e inducción a la consulta psicológica por primera vez, diagnóstico y rehabilitación.	Acciones programadas y realizadas	1	0	1	1	1	10.775.312,45	2.500.000,00	2.624.999,99	2.756.249,99	2.894.062,48	
3000000	Social	301	Salud publica		3	5.1	Mantener el porcentaje de curación de pacientes con tuberculosis en el 85%	Porcentaje de sintomáticos respiratorios captados	0%	100%	3.2	Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños	Implementar el Plan Estratégico Colombia Libre de Tuberculosis 2006-2015 para la expansión y fortalecimiento de la estrategia tratamiento acordado supervisado DOTS/TAS para el manejo de pacientes con tuberculosis.	Porcentaje curación de casos de Tuberculosis	100%	100%	100%	100%	100%						
3000000	Social	301	Salud publica		3	5.2	Curar el 100% de los pacientes para disminuir prevalencia	Municipio cumpliendo con la meta de curación de los casos de Lepra.	1	0	3.1	Acciones de Promoción de la salud y calidad de vida	Fortalecer la búsqueda activa de sintomáticos de piel (lepra) en el Municipio	ESE que cumplen con la Búsqueda Activa de Sintomáticos de piel	100%	100%	100%	100%	100%						
3000000	Social	301	Salud publica		3	5.2	Curar el 100% de los pacientes para disminuir prevalencia	Municipio cumpliendo con la meta de curación de los casos de Lepra.	1	0	3.2	Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación	Apoyo a la implementación de estrategias IEC a través de medios masivos de comunicación.	Estrategias IEC implementadas	1	1	1	1	1						
3000000	Social	301	Salud publica		3	6.2	Reducir los factores de Riesgo de las enfermedades Crónicas No Transmisibles	Prevalencia de actividad física global en adolescentes entre 15 y 17 años y Prevalencia de actividad física global en adultos entre 18 y 64 años. Edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años. Fuente: ENSIN	28% prevalencia actividad física de 15 a 17 años, 44,9% prevalencia actividad física en adultos de 18 a 64 años; 12,7 a 64 años edad promedio de inicio de consumo de cigarrillo. Fuente: ENSIN	30% prevalencia actividad física de 15 a 17 años, 46% prevalencia actividad física en adultos de 18 a 64 años; 14 a 64 años edad promedio de inicio de consumo de cigarrillo. Fuente: ENSIN	3.1	Acciones de Promoción de la salud y Calidad de vida	Desarrollo de estrategias intersectoriales que promueven la actividad física en escenarios educativos, laborales, comunitarios e institucionales.	Estrategias intersectoriales de actividad física implementadas.	1	1	1	1	1						
3000000	Social	301	Salud publica		3	6.2	Reducir los factores de Riesgo de las enfermedades Crónicas No Transmisibles	Prevalencia de actividad física global en adolescentes entre 15 y 17 años y Prevalencia de actividad física global en adultos entre 18 y 64 años. Edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años. Fuente: ENSIN	28% prevalencia actividad física de 15 a 17 años, 44,9% prevalencia actividad física en adultos de 18 a 64 años; 12,7 a 64 años edad promedio de inicio de consumo de cigarrillo. Fuente: ENSIN	30% prevalencia actividad física de 15 a 17 años, 46% prevalencia actividad física en adultos de 18 a 64 años; 14 a 64 años edad promedio de inicio de consumo de cigarrillo. Fuente: ENSIN	3.2	Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, ambientales y sanitarios).	Implementar la estrategia de instituciones educativas, espacios de trabajo y espacios públicos libres de humo, de tabaco y de combustibles, en coordinación con EPSs, ARP, sector educativo, cultura, deportes y otros sectores.	Estrategia de Instituciones libres de humo implementada.	1	1	1	1	1						
3000000	Social	301	Salud publica		3	6.2	Reducir los factores de Riesgo de las enfermedades Crónicas No Transmisibles	Prevalencia de actividad física global en adolescentes entre 15 y 17 años y Prevalencia de actividad física global en adultos entre 18 y 64 años. Edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años. Fuente: ENSIN	28% prevalencia actividad física de 15 a 17 años, 44,9% prevalencia actividad física en adultos de 18 a 64 años; 12,7 a 64 años edad promedio de inicio de consumo de cigarrillo. Fuente: ENSIN	30% prevalencia actividad física de 15 a 17 años, 46% prevalencia actividad física en adultos de 18 a 64 años; 14 a 64 años edad promedio de inicio de consumo de cigarrillo. Fuente: ENSIN	3.2	Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, ambientales y sanitarios).	Seguimiento a la aplicación de la norma técnica de atención al joven y adulto mayor y la guía de atención integral de la diabetes tipo I y II, hipertensión arterial, obesidad y modelo de atención de la enfermedad renal crónica.	EPS, IPS que aplican las normas técnica y guías de atención integral y modelo de atención programática en el POS.	100%	50%	100%	100%	100%						
3000000	Social	301	Salud publica		3	6.2	Reducir los factores de Riesgo de las enfermedades Crónicas No Transmisibles	Prevalencia de actividad física global en adolescentes entre 15 y 17 años y Prevalencia de actividad física global en adultos entre 18 y 64 años. Edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años. Fuente: ENSIN	28% prevalencia actividad física de 15 a 17 años, 44,9% prevalencia actividad física en adultos de 18 a 64 años; 12,7 a 64 años edad promedio de inicio de consumo de cigarrillo. Fuente: ENSIN	30% prevalencia actividad física de 15 a 17 años, 46% prevalencia actividad física en adultos de 18 a 64 años; 14 a 64 años edad promedio de inicio de consumo de cigarrillo. Fuente: ENSIN	3.2	Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, ambientales y sanitarios).	Articular las acciones de promoción y prevención de salud ocupacional a nivel de trabajadores informales y domiciliarios productores de sustancias nefrotóxicas para prevenir riesgo en la población.	Trabajadores informales y domiciliarios que inician programas preventivos de riesgo renal.	50%	0%	20%	35%	50%						
3000000	Social	301	Salud publica		3	7	Disminuir en 1% las enfermedades	Porcentaje de casos con limitaciones evitables como:	6,70%	6,60%	3.1	Acciones de Promoción de la salud y Calidad de vida	Identificación de la población y reorientación a los servicios del POS para la atención funcional en cualquier edad con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía en ámbitos cotidianos.	Reorientación de servicios del POS para la atención funcional, en cualquier edad, con deficiencia, discapacidad o minusvalía.	100%	10%	40%	80%	100%						

