

ANEXO.5 LISTADO DE AVES REGISTRADAS PARA EL MUNICIPIO DE LANDÁZURI

*bmhPM= bosque muy húmedopremontano bajo; bamhMB= bosque altoandino muy húmedo montano bajo, según clasificación del presente estudio.

** ZA= zona abierta; B= bosque; BB= borde de bosque; Q= quebrada; A= aéreo.

*** E= endémico de Colombia; CE= casi endémica: especies de las que la mitad de su distribución se encuentra dentro de los límites de un país con extensiones menores hacia uno o más países vecinos.

**** EN= en peligro; VU= vulnerable; CR= crítico; CA= casi amenazada.

*****MN= Migratoria del Norte.

+

NOTA 2: La información sobre grado de amenaza fue tomado de Renjifo et al. 2.002. Ver bibliografía.

	Familia	Género	Especie	Lugar de muestreo	Tipo de registro	Zona de vida*	Hábitat**	Distribución	Rango altitudinal	Grado de amenaza****	Nombre común
1	Ardeidae	Casmerodius	albus	L	V	bmhPM	ZA	Cosmopolita. Encontrada en latitudes templadas y tropicales. Hemisferio occidental desde S de Canadá hasta el S de Chile.	Hasta 2.600 m.		
2	Ardeidae	Bubucus	ibis	L	V	bmhPM	ZA	Al Oeste de los Andes y al Este de estos al Sur desde el Oeste de Caqueta y Vaupés, probablemente hasta Putumayo. Invasora del viejo mundo; ahora encontrada al E y S de E.U. y Canadá hasta el N de Chile, N de Argentina y SE de Brasil.	Hasta 2.600 m.		
3	Cathartidae	Cathartes	aura	L	V	bmhPM	A	Residente del Occidente de los Andes Orientales ; residente del E de los Andes Migrante del Norte y residente . Desde el S de Canadá hasta las Islas Falkland, Antillas y Trinidad.	Hasta 3.000 m. Usualmente a menor altura.		Guala (Landázuri)
4	Cathartidae	Coragyps	atratus	L	V	bmhPM	A	Cosmopolita en hábitats adecuados . Desde el centro de E.U. Hasta C de Chile y S de Argentina. Trinidad.	Hasta 2.700 m.		
4	Cathartidae	Coragyps	atratus	Z	V	BamhMB	A	Cosmopolita en hábitats adecuados . Desde el centro de E.U. Hasta C de Chile y S de Argentina. Trinidad.	Hasta 2.700 m.		
5	Accipitridae	Buteo	magnirostris	L	A	bmhPM	ZA	Desde el E de México hasta el C de Argentina y SE de Brasil. En Colombia en Guajira, Santa Marta, Valle del Magdalena desde la vertiente Oriental de los Andes Orientales hasta Antioquia y al Sur de Santander. En toda la zona oriental de Colombia.	Hasta 2.500 m.		Gavilán
5	Accipitridae	Buteo	magnirostris	Z	A	BamhMB	ZA	Desde el E de México hasta el C de Argentina y SE de Brasil. En Colombia en Guajira, Santa Marta, Valle del Magdalena desde la vertiente Oriental de los Andes Orientales hasta Antioquia y al Sur de Santander. En toda la zona oriental de Colombia.	Hasta 2.500 m.		Gavilán
6	Falconidae	Herpetotheres	cachinnans	L	A	bmhPM	ZA	Cosmopolita aunque sin registros en Vichada y Guainía. Desde México hasta Oeste de Perú, N de Argentina y S de Brasil.	Hasta 2.400 m.		
7	Falconidae	Falco	sparverius	Z	V	BamhMB	B	Se reproduce desde Norte America hasta Tierra del Fuego. Golfo de Urabá, Guajira, Bajo Valle del Cauca, Maipures, Vichada; Pacífico en el Valle del Cauca y nariño; Alto y medio Valle del Magdalena.	Hasta 3.200 m.		
8	Craidae	Penelope	sp.	Z	A	BamhMB	ZA				
9	Columbidae	Columba	fasciata	Z	V	BamhMB	ZA	En las tres cordilleras, Santa Marta y Perijá. Oeste de Norte América hasta el Oeste de Panamá; montañas del N de Venezuela hasta el NO de Argentina. Tierras altas del S de Venezuela y NW de Brasil.	2.000-3.000 m.		
10	Columbidae	Columba	subvinacea	L	V	bmhPM	B	Cosmopolita en zonas húmedas excepto en Chocó y Santa Marta. Costa Pacífica, Valle del Sinú, Valles del Magdalena y del Cauca, Snaia. Del Perijá, Valle del Zulia hasta NW de Arauca; E de Meta hasta S de Amazonas, Orinoco y Vaupés. Desde Costa Rica hasta el W de Panamá; E de Panamá hasta el W de Ecuador, E de Bolivia y Amazonia del Brasil.	Hasta 2.800 m., principalmente a menos de 1.500 m.		Maracaibera (Landázuri)
11	Columbidae	Columbina	talpacoti	L	V	bmhPM	ZA	Cosmopolita en zonas secas no en Juradó, Chocó. S de México, ocas. S de Texas , hasta el S de Argentina, Paraguay y Uruguay; accidental en Chile; NO de Perú y Trinidad.	Menos de 1.600 m; registros locales a 2.400 m.		
12	Columbidae	Leptotila	verreauxi	L	V	bmhPM	ZA	S de Texas y México hasta el O de Perú, C de Argentina y Uruguay. Medio y Alto Valle del Cauca; Costa Pacífica en el SO de Cauca y ambas vertientes de la Cordillera Occidental; Chocó cerca de Panamá, E de la Guajira y S del Valle del Magdalena, Norte de Santander y Vichada.	Hasta 2.700 m., principalmente a menos de 2.220 m.		
13	Psittacidae	Forpus	conspicillatus	L	VA	bmhPM	ZA	E de Panamá, Colombia y el Río Meta en Venezuela. SW de Nariño. Alto Valle del Dagua y del Patia, Medio y Alto Valle del Cauca. Alto Río Sinú, Bajo Cauca, Serranía del Perijá, Medio y Alto Magdalena hasta el S de Huila; E de los Andes desde Casanare hasta Meta.	200-1800 m.		

ANEXO

14	Psittacidae	Brotogeris	jugularis	L	V	bmhPM	ZA	Costa Pacífica hasta Serranía de Baudó. Zonas bajas desde el N de los Andes hasta Santa Marta, O de la Serranía de Perijá, al S al alto Nechí y alto Valle del Magdalena, E de los Andes en Norte de Santander y SW de Arauca. S de México hasta C de Venezuela.	Hasta 1.000 m.		
15	Cuculidae	Piaya	cayana	L	V	bmhPM	ZA	Cosmopolita. Desde el S de México hasta el N de Argentina y Uruguay.	Hasta 2.700 m.		Situra (Landázuri); guacharaquillo o rabo de mula (Zapatoca)
15	Cuculidae	Piaya	cayana	Z	V	BamhMB	ZA	Cosmopolita. Desde el S de México hasta el N de Argentina y Uruguay.	Hasta 2.700 m.		Situra (Landázuri); guacharaquillo o rabo de mula (Zapatoca)
16	Cuculidae	Crotophaga	ani	L	V	bmhPM	ZA	Cosmopolita. S de la Florida, O de la India y SW de Costa Rica hasta el O de Ecuador y N de Argentina.	Hasta casi 2.000 m.		
16	Cuculidae	Crotophaga	ani	Z	V	BamhMB	ZA	Cosmopolita. S de la Florida, O de la India y SW de Costa Rica hasta el O de Ecuador y N de Argentina.	Hasta casi 2.000 m.		
17	Cuculidae	Tapera	naevia	L	A	bmhPM	ZA	S de México hasta el SO de Ecuador, Bolivia y C de Argentina. Trinidad. Generalmente O de los Andes excepto en el Pacífico. E de los Andes desde el S de Meta y Río Guaviare, Amazonas cerca de Leticia.	Hasta 1.800 m.		Tres tres (Zapatoca)
18	Caprimulgidae	Caprimulgus	longirostris	Z	A	BamhMB	ZA	Las tres cordilleras, Santa Marta, Perijá. N de Venezuela, S de los Andes en Bolivia y Chile, S de Argentina, Paraguay y SE de Brasil.	1.600-3.600 m.		Mancara de pluma (Zapatoca)
19	Apodidae	Streptoprocne	zonaris	L	V	bmhPM	A	México hasta el N de Argentina, S de Brasil, Antillas y Trinidad. Una vez al S de la Florida Cosmopolita O de los Andes, Andes Orientales en piedemonte, Vaupés, Guainía. Amazonia cerca de Leticia.	Hasta 3.500 m.		
20	Trochilidae	Glaucis	hirsuta	L	V	bmhPM		Regiones boscosas a lo largo de todo el país. Alto río San Juan, Valle del Cauca. No hay registros en los llanos. C Panamá hasta el N de Bolivia y S de Brasil. Trinidad, Tobago, Grenada.	Hasta 1.000 m.; mayor número de registros a menos de 600 m.		Quincha
21	Trochilidae	Phaethornis	guy	L	VM	bmhPM	BB	Costa Rica hasta el N de Venezuela, y al SE de la Cordillera Peruana. Cauca, Snia. San Lucas, Andes Centrales hasta el S del Valle, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander hasta la Snia de la Macarena.	900-2.200 m.		Quincha
22	Trochilidae	Doryfera	ludoviciae	Z	M	BamhMB	B	Las tres cordilleras, Costa Rica, E de Panamá, NO de Venezuela, S en montañas bolivianas.	1.400-2.700 m.		Quincha
23	Trochilidae	Coeligena	prunellei	Z	M	BamhMB	ZA	Conocido sólo en la vertiente occidental de la Cordillera Oriental al SE de Santander (Virolin) y W Boyacá (Togui, NO de Tunja) hasta O de Cundinamarca (Facatativá, Laguna de Pedro Palo, Albán, La Vega, Yacopí, Guaduas, posiblemente a 1.000 m.?)	1.400-2.600 m.	EN B2ab(iii,iv)	Quincha
24	Trochilidae	Heliodytes	barroti	L	M	bmhPM	ZA	Costa Pacífica, zonas bajas a lo largo de la parte norte de los Andes, Valle del Magdalena Medio desde Bolívar hasta el S de Caldas. SE de México hasta Ecuador.	Hasta 1.000 m.		Quincha
25	Capitonidae	Capito	hypoleucus	L	V	bmhPM	B	Bajo Valle del Cauca, cabeceras del Río Nechí, Snia. San Lucas, Valle Medio del Magdalena al menos al N de Tolima y NO de Cundinamarca en Yacopí.	200-1.500 m.	EN A4c / VU B2ab(ii,iii)	Vieja (Landázuri)
26	Ramphastidae	Ramphastos	citroelaemus	L	V	bmhPM	C*	Extremo N del O de los Andes (alto Valle del Sinú), Valle del Magdalena hacia el S en el N del Tolima, E de los Andes en Norte de Santander (tierras bajas del Catatumbo). N de Colombia y W de Venezuela.	Hasta 900 m.		
27	Ramphastidae	Ramphastos	swainsonii	L	A	bmhPM	B	Costa Pacífica, base N de los Andes Centrales y Occidentales, en el Valle del Cauca, arriba de Popayán, al S del Valle del Magdalena hasta el E de Antioquia. Honduras hasta el O de Ecuador.	Hasta 2.000 m.		Diostedé (Landázuri)
28	Picidae	Picumnus	olivaceus	L	V	bmhPM	ZA	Zonas bajas de Nariño, N de Chocó, Alto Río San Juan, Alto Valle del Sinú hasta la Snia. De San Jacinto, Ambas vertientes de las cordilleras Central y vertiente oriental de la Cordillera Oriental en Norte de Santander. Desde Guatemala hasta el O de Ecuador y NO de Venezuela.	Hasta 1.800 m.		
29	Picidae	Dryocopus	lineatus	L	V	bmhPM	ZA	Cosmopolita. México hasta el NO de Perú, N de Argentina, Paraguay y SE de Brasil.	Hasta 2.100 m.		
30	Picidae	Melanerpes	chrysauchen	L	V	bmhPM	ZA	Valle del Magdalena Medio desde la Snia San Lucas hasta S de Honda, N de Tolima. Costa Rica hasta el SO de Panamá; N de Colombia.	400 - 1.400 m.	VU A4c	

ANEXO

31	Picidae	Veniliornis	cf. kirkii	L	V	bmhPM	ZA	Valle del Magdalena desde Cauca hasta el Norte del Huila; Norte de Santander (Catatumbo y Zulía) Posiblemente Arauca y Vichada. Costa Rica hasta el O de Ecuador y O y C de Venezuela.	Hasta 300 m (Chocó); 1.300 m. (Magdalena Medio).		
32	Dendrocolaptidae	Dendrocinclá	fuliginosa	L	V	bmhPM	B	Cosmopolita. No en Guajira o Alto Magdalena ni en el Valle del Cauca. S de Honduras hasta el O de Ecuador, N de Argentina, S de Brasil y Trinidad.	Hasta 1.500 m., principalmente a menos de 1.200 m.		
33	Furnariidae	Synallaxis	cf. azarae	Z	V	BamhMB	ZA	Andes Centrales, Orientales y Occidentales. NO de Venezuela en los Andes hasta el N de Bolivia.	Hasta 3.100 m.		
34	Furnariidae	Premnoplex	brunnescens	Z	M	BamhMB	B	Cerros en el borde de Panamá, Santa Marta y Snia., de Perijá, Andes en Macarena. Costa Rica y N de Venezuela y al S en los Andes de Bolivia.	1.200-2.600 m.		
35	Furnariidae	Anabacertia	striaticollis	Z	VM	BamhMB	B	Snia. De Perijá y Andes excepto Nariño, SE de Nariño. N de Venezuela hasta el S hasta el N de Bolivia.	1.00-2.400 m.		
36	Formicariidae	Thamnophilus	doliatus	Z	A	BamhMB	ZA	O de Cundinamarca, SE de Boyacá. Golfo de Urabá hacia la Guajira y Valle del Magdalena hasta el Huila. E de los Andes; registros dispersos hasta el Amazonas. México hasta el O de Perú. Guianas, Venezuela, S de Bolivia, Argentina y Paraguay. Trinidad y Tobago.	Principalmente a menos de 800 m.; hasta 1.500 m.		
37	Formicariidae	Grallaria	hypoleuca	Z	A	BamhMB	B	Ambas vertientes de los Andes Centrales en Antioquia, vertiente occidental de los Andes Orientales desde el SE de Santander hasta el S hasta la cabecera del Magdalena en Huila. Andes de Colombia hasta el E de Ecuador y Perú.	1.500-2.100 m.		
38	Pipridae	Manacus	manacus	L	A	bmhPM	BB	Desembocadura del Río Sinú E, Guajira y al S Bajo Cauca; Valle del Magdalena Medio, Cauca, Nariño y a lo largo de los Andes orientales Guianas, Venezuela, N de Bolivia, NE de Argentina, Paraguay y S de Brasil. O de Ecuador. Trinidad.	Hasta 1.900 m.		
39	Cotingidae	Pachyrampus	cf. cinnamomeus	L	V	bmhPM	B	Bajo Valle del Magdalena, N de Sucre, zonas bajas del N de los Andes, Guajira, Valle del Magdalena Medio y medio Valle del Cauca. E de los Andes desde las zonas bajas del Catatumbo hasta Meta (Villavicencio). SE de México hasta el SO de Ecuador y O de Venezuela.	Hasta 1.300 m.		
40	Tyrannidae	Zimmerius	viridiflavus	L	VA	bmhPM	B-BB	Santa Marta y Perijá. Las tres cordilleras. NO de Venezuela, S en los Andes de Perú.	300 - 2.400 m.		
41	Tyrannidae	Elaenia	flavogaster	L	A	bmhPM	ZA	Virtualmente por todos los lugares. No hay registros en el NO del Pacífico o en el Amazonas. S de México, N de Argentina y SE de Brasil. Trinidad, Antillas Menores.	Hasta 2.100 m.		
42	Tyrannidae	Mionectes	oleaginea	L	V	bmhPM	B	Cerro Tacarcuna en el límite con Panamá, Costa Pacífica, piedemonte a lo largo del Valle del Magdalena Medio hasta Cundinamarca; medio Valle del Cauca (Yotoco, Valle); Sierra Nevada de Santa Marta y Snia. De Perijá. E de Cordillera Oriental hasta el S de Meta. Costa Rica hasta el N de Venezuela y al S en colinas y montes de Perú.	Hasta 1.800 m.; principalmente a menos altura		
43	Tyrannidae	Todirostrum	cinereum	L	V	bmhPM	ZA	Zonas bajas, en números decrecientes hasta 1.900 m. Vertiente del Pacífico desde SO de Cauca hasta Nariño; O y E de los Andes excepto Guajira. Putumayo, posiblemente Guainía desembocadura del Río Guaviare. S de México hasta el NO de Perú, Bolivia y SE de Brasil (excepto la mayoría de la Amazonia)	Zonas bajas y en menor número hasta 1.900 m.		
44	Tyrannidae	Sayornis	nigricans	L	V	bmhPM	Q-ZA	Santa Marta y Perijá. Las tres cordilleras y Macarena. O de Norteamérica hacia el S hasta el NO de Argentina.	100-2.800 m.		
45	Tyrannidae	Ochthoeca	cinnamomeiventris	Z	V	BamhMB	B	Las tres cordilleras. NW de Venezuela, S en los Andes de Bolivia.	1.600-3.200 m.		
46	Tyrannidae	Colonia	colonus	L	V	bmhPM	ZA	Por todas partes en regiones húmedas al O de los Andes excepto en el Caribe y Santa Marta. E de los Andes desde el límite Casanare - Cundinamarca y NO de Meta hasta el SE de Nariño; posiblemente en Amazonas. O de Honduras, Ecuador, Perú, NE de Argentina, Paraguay y SE de Brasil.	Hasta 1.800 m.; principalmente a menos de 1.200 m.		
47	Tyrannidae	Pitangus	sulphuratus	L	VA	bmhPM	ZA	Por todas partes excepto al O de los Andes. Costa Caribe desde el N de Sucre hasta Guajira; Río Sinú, Valle del Cauca, Medio y Alto valle del Magdalena. E de los Andes desde S de Meta hasta Vaupés. O de Caquetá hasta Amazonas. S de Texas y México hasta C de Argentina.	Hasta 1.500 m.		
48	Tyrannidae	Myiozetetes	cayanensis	L	A	bmhPM	ZA	O del Este de los Andes, E de los Andes desde Norte de Santander hasta Tres Esquinas; O de Caquetá, Mitú y Vaupés. O de Panamá hasta O y E de Ecuador, Venezuela, Guianas, N, E, SE de Brasil, a lo largo de Mato Grosso hasta el E de Bolivia y S de Perú.	Hasta 1.500 m.; raramente hasta 2.100 m.		

ANEXO

49	Tyrannidae	Legatus	leucophaeus	L	A	bmhPM	ZA	Por todas partes en hábitats adecuados. SE de México hasta el N de Argentina y SE de Brasil. Aves Centroamericanas aparentemente migran a Suramérica durante la época en que no se reproducen. Aves del S migran al N en el invierno austral.	Hasta 1.700 m.		
50	Tyrannidae	Tyrannus	melancholicus	L	VA	bmhPM	ZA	Por todas partes. Se reproduce desde el S de México hasta el C de Argentina. Islas Dutch Leeward, Trinidad.	Hasta 2.700 m.		Pimparo (Landázuri)
50	Tyrannidae	Tyrannus	melancholicus	Z	VA	BamhMB	ZA	Por todas partes. Se reproduce desde el S de México hasta el C de Argentina. Islas Dutch Leeward, Trinidad.	Hasta 2.700 m.		Pimparo (Landázuri)
51	Corvidae	Cyanocorax	affinis	L	VA	bmhPM	B	Costa pacífica hacia el S del Valle, zonas bajas al N de los Andes en Santa Marta, localmente al E de Guajira, S en el Valle del Cauca hasta Medellín, y en el Valle del Magdalena hasta el S de Tolima. E de Norte de Santander (Valles del Zulia y zonas bajas del Catatumbo). Costa Rica hasta el O de Venezuela.	Hasta 2.200 m.		Urraca
52	Corvidae	Cyanocorax	yncas	Z	VA	BamhMB	B	Snia. De Perijá hasta la vertiente oriental de los Andes Orientales cerca de Cúcuta. Hacia el sur vertiente oriental en Cundinamarca, vertiente occidental de los Andes Orientales, Andes Centrales y Occidentales hasta el S del Valle. Andes Occidentales en Cauca y Nariño. SE de Texas hasta Honduras. N de Venezuela hasta el N de Bolivia.	1.200-2.800 m. A 900 m. en el Cauca (Pacífico).		Urraca
53	Troglodytidae	Campylorhynchus	zonatus	L	VA	bmhPM	ZA	Parte N de Colombia desde el lado occidental del Golfo de Urabá y Bajo Sinú hasta la base So de la Sierra Nda de Santa Marta y el alto valle del Cesar. Registros dispersos en el Valle del Magdalena hasta Bogotá. E de México hasta NO de Panamá, N de Colombia, NO de Ecuador	Hasta 1.600 m.		Carraquero; carraco (Landázuri)
54	Troglodytidae	Troglodytes	aedon	L	VA	bmhPM	ZA	Cosmopolita. A veces ausente en áreas extensamente cubiertas por bosque. S de Canadá hasta toda Sur América.	Hasta 3.400 m.		Cucarachero
54	Troglodytidae	Troglodytes	aedon	Z	VA	BamhMB	ZA	Cosmopolita. A veces ausente en áreas extensamente cubiertas por bosque. S de Canadá hasta toda Sur América.	Hasta 3.400 m.		Cucarachero
55	Troglodytidae	Henicorhina	leucophrys	Z	A	BamhMB	B	Santa Marta, vert. Occidental Andes Occidentales hasta el O de Nariño, alto valle del Atrato, Snias del Baudó, Darién y Perijá. Vertiente occidental de la Cordillera Oriental en Santander y vertiente oriental de Nariño. Macarena y Caquetá. México hasta el N de Venezuela y al S en los Andes hasta el N de Bolivia	1.000-2.900 m.		
56	Troglodytidae	Microcerculus	marginatus	L	M	bmhPM	B	Costa Pacífica, N de los Andes en zonas húmedas hasta el Piedemonte de Santa Marta, Snia. De Perijá en Guajira y al S en el bajo Cauca y Valle medio del Magdalena; E de los Andes en Norte de Santander y desde el O de Meta y hacia el Sur en Vaupés. SE de México hasta el O de Ecuador, N de Bolivia, Amazonia brasileña y Venezuela.	Hasta 1.200 m.		
57	Mimidae	Mimus	gilvus	L	V	bmhPM	ZA	Al O de los Andes en zonas no boscosas y al E en la Macarena y E de Vichada (Tuparro). S México hasta Honduras; introducida en Panamá. Colombia hasta Iñas Guyanas, N y SE de Brasil. La mayoría de islas Caribe.	Hasta 2.600 m.; usualmente más bajo.		
57	Mimidae	Mimus	gilvus	Z	V	BamhMB	ZA	Al O de los Andes en zonas no boscosas y al E en la Macarena y E de Vichada (Tuparro). S México hasta Honduras; introducida en Panamá. Colombia hasta Iñas Guyanas, N y SE de Brasil. La mayoría de islas Caribe.	Hasta 2.600 m.; usualmente más bajo.		
58	Turdidae	Myadestes	ralloides	Z	A	BamhMB	B	Las tres cordilleras y Snia de la Macarena. Montañas del NO de Venezuela, S en los Nades hasta el N de Bolivia.	1.200-2.700 m.		
59	Turdidae	Turdus	fuscater	Z	VA	BamhMB	ZA	Santa Marta, Perijá, E de los Andes desde N de Santander hasta al menos Cundinamarca; parte N de los Andes Occidentales en Antioquia. Resto del O de los Andes, todos los Andes Centrales y ambas vertientes en Nariño. NO de Venezuela S en los Andes hasta Bolivia.	1.400-4.100 m.		
60	Icteridae	Psarocolius	angustifrons	L	VA	bmhPM	Q-BB	Zonas bajas de los Andes Centrales y Occidentales hasta el S de Nariño. Vert. Occidental de la Cordillera Oriental desde Santander hasta la cabecera del Valle de Magdalena. Snia. De Perijá y vert. Oriental de los Andes Orientales desde Cundinamarca hasta Caquetá. E de los Andes desde Meta y vaupés hasta el Amazonas. N y O de Venezuela, O de Ecuador, N de Bolivia y O de Amazonia brasileña.			Cucuchona (Landázuri)

ANEXO

61	Icteridae	Cacicus	uropygialis	L	V	bmhPM	B	Costa Pacífica Andes Occidentales (alto valle del Sinú hasta Pto. Valdivia en el bajo Valle del Cauca. 1500-2300 m Andes Occidentales desde Valle , Andes Centrales hasta el S de Quindío, vert. Occidental de Andes Orientales en Cundinamarca, al S hasta cabecera del valle del Magdalena, Norte de Santander y al O de Putumayo. E de Panamá hasta O de Ecuador, O de Venezuela y el E y O de Ecuador, W de Venezuela, y S en los Andes hasta NE de Perú.	Hasta 1.000 m.; principalmente a menos de 700 m.	CA	Arrendajo (Landázuri)
62	Icteridae	Cacicus	leucoramphus	Z	V	BamhMB	BB	Registros dispersos en las tres cordilleras. W de Venezuela, S en los Andes bolivianos.	1.700-3.200 m.		
63	Icteridae	Macroagelaius	subalaris	Z	VA	BamhMB	B-ZA	Ambas vertientes de los Andes Orientales en Norte de Santander y la vertiente occidental del NE de Santander (Cachirí, Páramo de San Turbán). Al S localmente hasta SO de Cundinamarca (Fusagasugá)	1.950-3.100 m.	CR B1ab(iii,iv)	Cocha (Zapatoca)
64	Icteridae	Icterus	chrysater	Z	VA	BamhMB	ZA	Generalmente al O de los Andes (excepto en Guajira), al S en Nariño y altos valles del Cauca y del Magdalena. Vertiente oriental de los Andes Orientales al S hasta Meta y Macarena. México hasta Colombia y N de Venezuela. (No hay registros en Costa Rica).	50-2.700 m.		Toche (Zapatoca, Landázuri)
65	Parulidae	Vermivora	peregrina**	Z	V	BamhMB	ZA	Al O de los Andes y en la vertiente oriental en meta. Se reproduce en Norteamérica; pasa el invierno principalmente desde Guatemala hasta el N de Venezuela, pocos registros en Ecuador.	Hasta 2.600 m.		
66	Parulidae	Myioborus	miniatus	Z	V	BamhMB	ZA	Sierra Nda de Sta. Marta y Snia. De Perijá y la Macarena. N México, raramente hacia el SO de E.U.) hasta Guyana, N de Brasil (sólo en tierras altas) y Andes hasta el S de Bolivia.	500-2.700 m.		
67	Parulidae	Basileuterus	fulvicauda	L	VA	bmhPM	Q	Costa Pacífica y desde el Golfo de Urabá hasta el valled del Magdalena Medio hasta el S de Huila, E de los Andes desde el O de Meta hacia el S. Honduras hasta NO de Perú. E de Colombia y O de Brasil hasta el E de Ecuador y SE de Perú.	Hasta 1.000 m.		
68	Coerebidae	Coereba	flaveola	L	A	bmhPM	ZA	Cosmopolita (sin registros en Amazonas). SE de México hasta NE de Argentina. S Florida, Indias occidentales excepto (Cuba) hasta Trinidad.	Hasta 1.500 m.		Chupaflor (Landázuri)
69	Coerebidae	Diglossa	cyanea	Z	V	BamhMB	ZA	Las tres cordilleras. N y W de Venezuela (incluyendo la Snia. De Perijá) hacia el S hasta el N de Bolivia.	1.800-3.600 m.		
70	Coerebidae	Chlorophanes	spiza	L	V	bmhPM	BB	Costa Pacífica desde el bajo valle del Atrato hacia el Sur y generalmente hacia el E en la vte. Oriental de los Andes Orientales . Snia del Perijá. E de los Andes desde Norte de Santander hacia el sur (llanos?). SE de México hasta O de Ecuador, Bolivia y S de Brasil.	Hasta 2.300 m.		
71	Thraupidae	Euphonia	lanirostris	L	V	bmhPM	ZA	Por todas partes. Costa Rica hasta O de Perú, N de Bolivia y Amazonia brasileña.	Hasta 1.800 m.; principalmente a menos de 1.110 m.		
72	Thraupidae	Euphonia	fulvicrissa	L	V	bmhPM	ZA	Costa Pacífica y zonas bajas húmedas en la parte N de los Andes hasta el Valle del Magdalena Medio, Norte de Santander. C Panamá hasta NO de Ecuador.	Hasta 1.110 m.; principalmente a menos de 500 m.		
73	Thraupidae	Tangara	arthus	L	V	bmhPM	B	Andes Occidentales y vertiente occidental y oriental de los Andes Centrales, vertiente occidental de los Andes Orientales desde Cundinamarca hasta Huila; vert occidental de los Andes Orientales en Norte de Santander. Ambas vertientes de los Andes Orientales en Santander y Boyacá y Snia. de la Macarena. N Venezuela hacia el Sur hasta Bolivia.	700-2.500 m.		Saina (Landázuri)
74	Thraupidae	Tangara	xanthocephala	Z	V	BamhMB	BB-ZA	Snia. De Perijá, las tres cordilleras y la Snia de la Macarena. NO de Venezuela, S en los Andes hasta el N de Bolivia	1.300-2.400 m.		Saina (Landázuri)
75	Thraupidae	Tangara	cyanicollis	L	V	bmhPM	B-ZA	Las tres cordilleras. N de Venezuela (Incluido Perijá). Hasta el N de Bolivia, S de Brasil.	Principalmente de 900-2.400 m. Hasta 400 m en la vte. Pacífica en el Valle.		Saina (Landázuri)
76	Thraupidae	Tangara	gyrola	L	V	bmhPM	B-ZA	Andes Centrales y Occidentales, colinas húmedas desde el N de Córdoba hasta el S de Bolívar, Snia de Perijá. Vte. Occidental de los Andes en nariño, Santa marta y vte oriental de los Andes Orientales desde N de Santander y Boyacá, Meta, SE de Nariño , Putumayo, Guainía, de forma dispersa hasta Amazonas. Costa Rica hasta el O de Ecuador, N de Bolivia y Amazonia brasileña.	Hasta 2.100 m. De 500 a 2.100 m en la Vte. Pacífica.		Saina (Landázuri)

ANEXO

77	Thraupidae	Tangara	vitriolina	Z	V	BamhMB	ZA	Valles interandinos incluidos el medio y alto Magdalena, Cauca, Dagua, Patía y al S por C Nariño. Recientemente dispersándose en áreas húmedas deforestadas en la Vte. Pacífica. Colombia y NO de Ecuador.	500-2.200 m. (Una vez registrada a 3.000 m.)		Saina (Landázuri)
78	Thraupidae	Thraupis	episcopus	L	VA	bmhPM	ZA	SO de Cauca y O de Nariño; resto de Colombia al O de los Andes incluida la Sierra Nda de Sta Marta, Norte de Santander y NO de Arauca. O de Casnare y Meta.	Hasta 2.600 m.		
78	Thraupidae	Thraupis	episcopus	Z	VA	BamhMB	ZA	SO de Cauca y O de Nariño; resto de Colombia al O de los Andes incluida la Sierra Nda de Sta Marta, Norte de Santander y NO de Arauca. O de Casnare y Meta.	Hasta 2.600 m.		
79	Thraupidae	Thraupis	palmarum	Z	V	BamhMB	ZA	Por todas partes (Excepto en Guajira?). Nicaragua hasta el N de Bolivia, Paraguay y SE de Brasil. Trinidad.	Hasta 2.100 m.		
80	Thraupidae	Ramphocelus	dimidiatus	L	VA	bmhPM	ZA	Generalmente al W de los Andes Orientales, excepto en la Costa pacífica donde solo se encuentra en los valles de Dagua y Anchicayá. E de los Andes en Norte de Santander (zonas bajas del Catatumbo). O Panamá hasta O de Venezuela.	Hasta 1.500 m.		Cardenal (Landázuri)
81	Thraupidae	Tachyphonus	luctuosus	L	V	bmhPM	B	Virtualmente en todas las regiones con bosque húmedo. No hay registros en Guainía o en el N de Amazonas. Avistamientos al S de la Amazonía. Honduras hasta O de Ecuador, N de Bolivia, Amazonia Brasileña, Surinam y Guyana francesa. Trinidad.	Hasta 2.220 m.		
82	Thraupidae	Chlorospingus	sp.	Z	V	BamhMB	BB				
83	Thraupidae	Chlorornis	riefferi	Z	V	BamhMB	BB	Andes Centrales y Occidentales y Andes Orientales desde Boyacá hacia el S. Desde Colombia hacia el S en los Andes hasta el N de Bolivia.	1.700-3.300 m.		
84	Fringillidae	Atlapetes	rufinucha	Z	M	BamhMB	BB	Dispersa. Perijá, Andes Orientales desde Boyacá (desde Soatá hasta la laguna de Fúquene al borde de Cundinamarca. Ambas vertientes de los Andes Centrales en Antioquia. Vertiente Oriental de los Andes Occidentales en Valle del Cauca y vertiente occidental de los Andes Centrales cerca a Popayán, Nariño, NO de Venezuela hasta Perú y el N de Bolivia.	1.600-2.700 m.		
85	Fringillidae	Atlapetes	brunneinucha	L	V	bmhPM	B	Snia de Perijá, todos los Andes incluida la Macarena. Dudosamente en límites con Panamá (pero no en Santa Marta). México hasta el O de Ecuador y el S de Perú.	1.700-3.600 m.		Cotudo (Landázuri)
86	Fringillidae	Sporophila	luctuosa	Z	V	BamhMB	ZA	Snia de Baudó, Sierra Nda, de Santa Marta, vert. Occidental Andes Occidentales en Antioquia y vertiente E y S de Cauca; vertiente O de los Andes Orientales desde Santander hasta Cundinamarca y zona E de los Andes en Meta, O de Caquetá y posiblemente O de Putumayo. NO de Venezuela, hacia el S hasta el N de Bolivia.	Principalmente 1.500-2.500 m. (registros desde 100 - 3200 m.)		
87	Fringillidae	Sporophila	nigricollis	L	V	bmhPM	ZA	Por todas partes excepto en las regiones secas del N de los Andes y la Amazonía. SO de Costa Rica hasta el N de Bolivia y SE de Brasil. Trinidad y Antillas Menores.	Hasta 2.300 m.		
87	Fringillidae	Sporophila	nigricollis	Z	V	BamhMB	ZA	Por todas partes excepto en las regiones secas del N de los Andes y la Amazonía. SO de Costa Rica hasta el N de Bolivia y SE de Brasil. Trinidad y Antillas Menores.	Hasta 2.300 m.		
88	Fringillidae	Sporophila	minuta	L	V	bmhPM	ZA	Al O de los Andes excepto la Costa Pacífica. E de los Andes hasta el S de Caquetá y Vaupés. O de México hasta el NO de Ecuador, E de Bolivia y N de Argentina. No hay registros en el C y el O de Amazonas.	Hasta 1.000 m.		
89	Fringillidae	Volatinia	jacarina	L	VA	bmhPM	ZA	Por todas partes. A veces ausentes en zonas con bosques muy extensos. S de México hasta O de Perú, N de Chile, Argentina y S de Brasil.	Hasta 2.220 m.		Renegrero (Landázuri)
90	Fringillidae	Sicalis	flaveola	P	VA		ZA	Región Caribe desde Córdoba hasta Guajira, Bajo Cauca, E de los Andes desde Arauca en límites con Venezuela, Meta, y E de Vichada. Introducido en Cali y en Buenaventura. Localmente por todo Suramérica hasta C Argentina. Trinidad. Introducida en Panamá y Jamaica.	Hasta 1.000 m.		
91	Fringillidae	Zonotrichia	capensis	Z	VA	BamhMB	ZA	Snia de Macuira (250 m.), Sierra Nda de Sta. Marta, Perijá, Snia de la Macarena. Guainía, localmente en bolsillos de sabana. Vaupés. S de México hasta Tierra del Fuego (principalmente en montañas).	1.000-3.700 m.		
92	Fringillidae	Carduelis	psaltria	Z	VA	BamhMB	ZA	Por todas partes excepto en las zonas bajas del E de los Andes. O de los E.U. Hasta Venezuela, y el N. De Perú.	200-3.100 m.		